



Informacja o badaniu cieniującym jelita grubego

DO 3

Pracownia RTG

tel. 61 8419 – 371, 61 8419-570

I. BADANIE CIENIUJĄCE JELITA GRUBEGO JEST BADANIEM DWUKONTRASTOWYM:

I FAZA - za pomocą specjalnego zestawu podaje się doodbytniczo zawiesinę barytu pod kontrolą fluoroskopii do momentu wypełnienia całego jelita grubego (w pozycji leżącej, bocznej, skośnej lub na brzuchu).

Po wypełnieniu się całego jelita grubego pacjent udaje się do toalety w celu opróżnienia jelita z zawiesiny barytu.

II FAZA - po opróżnieniu pacjenta z barytu podaje się powietrze w pozycji leżącej i wykonuje zdjęcia w w/w projekcjach (pozycjach).

Badanie trwa około 1 godziny.

II. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA JELITA GRUBEGO:

Dzień poprzedzający badanie:

1. rano po śniadaniu zażyć środek przeczyszczający (preparat dostępny w aptece),
2. gdy nie nastąpi działanie przeczyszczające powtórzyć dawkę w godzinach popołudniowych,
3. o godzinie 13.00 obiad: lekka zupa,
4. wieczorem głęboki wlew przeczyszczający - koniecznie w pozycji leżącej (preparaty gotowe dostępne w aptece)

Dzień badania:

1. rano głęboki wlew przeczyszczający - koniecznie w pozycji leżącej (preparaty gotowe dostępne w aptece)
2. do badania pacjent musi zgłosić się NA CZCZO!